

2. బీజగణితం

- ☞ గణిత శాస్త్రంలో “బీజగణితం” ఒక ముఖ్యభాగము. బీజగణితంలో అక్షరములు $a, b, c, \dots$ సంఖ్యలు $1, 2, 3, \dots$ మరియు గణిత పరిక్రియలు ఉపయోగిస్తారు.
- ☞ స్థిర, చరాశులను ఉపయోగించి సమస్యలను సాధించు విధానమే “బీజగణితం”.
- ☞ “బీజగణితం”ను ఆంగ్లములో “ఆల్జీబ్రా” అందురు. ఇది “ఆల్జబర్” అనే అరబిక్ పదం నుండి వచ్చిందని ప్రాచుర్యం పొందింది.
- ☞ బీజగణిత పితామహుడు : “డయా ఫాంటన్”
- ☞ **స్థిరరాశి:** స్థిరరాశి విలువ మారదు. ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది.
ఉదా: $8, -9, 1, \frac{-3}{4}, 2.6$ మొ॥నవి
- ☞ **చరరాశి:** చరరాశి విలువ మారుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండదు.
ఉదా: $a, b, c, x^2, y, z, 4l$ మొ॥నవి
- ☞ **పదం :** పదం అనేది ‘స్థిరరాశి’ లేదా ‘చరరాశి’ మరియు స్థిర, చర రాశుల లబ్ధం. ఇది ధన లేదా ఋణ సంఖ్య కావచ్చు.
ఉదా: $4, -3xy, \frac{7}{10}ab^2c$ etc...,
- ☞ **సమాసం :** ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదాలను ‘+’ లేదా ‘-’ గుర్తులతో వేరుచేసిన దానిని “సమాసం” అంటారు.
ఉదా: $2x, 3a - 5, 6x^2 - 7xy + 1$ మొ॥నవి
- ☞ **బీజీయ సమాసం :** స్థిర పదాలు మరియు చరపదాలు కలిగి కూడిక (+), తీసివేత (-) లతో కలుపబడిన దానిని “బీజీయ సమాసం” అంటారు.
ఉదా: $2x + 3y, ax^2 + bx + c$ మొ॥నవి
- ☞ **గుణకము :** గుణకములు రెండు రకాలు
 - ఎ) సంఖ్యా గుణకము
 - బి) బీజీయ గుణకము (చరరాశి గుణకము)
- ☞ **ఎ) సంఖ్యాగుణకము:** ఒక సంఖ్యా పదంలో స్థిరసంఖ్య, చరరాశి లబ్ధంలో స్థిర సంఖ్యను “సంఖ్యా గుణకము” అంటారు.
ఉదా: - $64l^3$ లో 64 ను l^3 యొక్క సంఖ్యా గుణకము అంటారు.
(చరరాశి ముందు ఎటువంటి సంఖ్యాగుణకం లేనిచో చరరాశి గుణకం 1గా తీసుకోవాలి)
- ☞ **బి) బీజీయగుణకము:** ఒక బీజీయ పదంలో స్థిర, చరరాశుల లబ్ధంలో, స్థిరరాశి గుణకము చరరాశి గుణకం అవుతుంది.

ఉదా: - $9a^2b$ లో చరరాశి గుణకము a^2b

$2x$ లో చరరాశి గుణకము x

☞ **సజాతి పదాలు :** సమాన ఘాతాంకాలతో కూడి ఒకే చరరాశులను కలిగియున్న పదాలను “సజాతి పదాలు” అంటారు.

ఉదా: - (i) $3x, \frac{-5}{2}x, 17x$ (ii) $8a^2b, \frac{5}{7}a^2b, -11a^2b$ మొ॥నవి

☞ **విజాతి పదాలు :** విభిన్న చరరాశులు కలిగిన పదాలను “విజాతి పదాలు” అంటారు.

ఉదా: - $x^2y, -6xy, 8xy^3$ మొ॥నవి

☞ **బీజీయ సమాసాలు - రకాలు :**

ఎ) ఏకపది : ఒక బీజీయ సమాసంలో “ఒకే ఒక పదం” ఉంటే దానిని “ఏకపది” అంటారు.

ఉదా: - $2x, 3a^2b, 3lmn$ మొ॥నవి

బి) ద్విపది : ఒక బీజీయ సమాసంలో “రెండు పదాలు” ఉంటే దానిని ‘ద్విపది’ అంటారు.

ఉదా: - $x-2y, 2m^2n-7, ax+b$ మొ॥నవి

సి) త్రిపది : ఒక బీజీయ సమాసంలో “మూడు పదాలు” ఉంటే దానిని ‘త్రిపది’ అంటారు.

ఉదా: - $x+y+z, ax^2+bx+c, 3x^2-7x+6$ మొ॥నవి

డి) బహుపది : ఒక బీజీయ సమాసంలో “మూడు కంటే ఎక్కువ” పదాలు ఉంటే దానిని ‘బహుపది’ అంటారు.

ఉదా: - $x+y+z+w, 2x-3y+4z+7$ మొ॥నవి

☞ **బీజీయ సమాసాల సంకలనం :**

రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సజాతి బీజీయ పదాల మొత్తం ఒక సజాతి పదం.

ఉదా: - 1) $2x$ మరియు $4x$ ల సంకలనం కనుగొనుము.

జ) $2x+4x=6x$

☞ **బీజీయ సమాసాల వ్యవకలం :**

రెండు సజాతి పదాల భేదం ఒక సజాతి పదం

ఉదా: - 1) $5x$ నుండి $3x$ ను తీసివేయండి.

జ) $5x-3x=2x$

☞ **బీజీయ సమాసాల గుణకారం :**

ఘాతాంక న్యాయాల ప్రకారం రెండు లేదా ఎక్కువ పదాలను గుణించగా వచ్చు పదం ఒక బీజీయ పదం అవుతుంది.

ఉదా: - 1) $2x$ నుండి $3x$ ను గుణించండి.

$$(2x) \times (3x) = (2) \times (3) \times (x) \times (x) = 6x^2$$

2) $(x+2)$ మరియు $(2x+3)$ ల లబ్ధం కనుగొనుము.

$$\text{జ. } (x+2)(2x+3)$$

$$= x(2x+3) + 2(2x+3)$$

$$= 2x^2 + 3x + 4x + 6$$

$$= 2x^2 + 7x + 6$$

$(x+2)(2x+3)$ ల గుణకాల

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \\ 2 \quad 3 \\ \hline 2 \quad 4 \\ \quad 3 \quad 6 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 6 \\ = 2x^2 + 7x + 6 \end{array}$$

☞ **బీజీయ పదాల భాగహారము :**

రెండు బీజీయ పదాలను ఒకదానితో మరొకటి ఘాతాంకాల భాగహార నియమం ప్రకారం భాగించాలి.

ఉదా: - 1. $6x^2$ ను $2x$ చే భాగించండి.

$$\text{జ. } \frac{6x^2}{2x} = \frac{6 \cdot x \cdot x}{2 \cdot x} = 3x$$

2. $-8xy$ ను $6x$ చే భాగించండి.

$$\text{జ. } \frac{-8xy}{6x} = \frac{-8 \cdot x \cdot y}{6 \cdot x} = \frac{-4y}{3}$$

భాగహార నియమం : విభజ్యము = విభజకము $\times$ భాగఫలం + శేషము

$$\text{i.e. } P(x) = g(x) \times q(x) + R$$

☞ **బహుపది పరిమాణము :**

x చరరాశి గల బహుపదిలో x యొక్క గరిష్ట ఘాతకము, ఆ బహుపది యొక్క పరిమాణము అవుతుంది.

$$\rightarrow ax + b \text{ బహుపది పరిమాణము} = 1$$

$$\rightarrow ax^2 + bx + c \text{ బహుపది పరిమాణము} = 2$$

$$\rightarrow a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n \text{ అనేది } 'n' \text{వ పరిమాణ బహుపది అంటారు.}$$

ఇందులో $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ లు చరరాశి వాస్తవ గుణకాలు మరియు $a_0 \neq 0$

☞ **శూన్య బహుపది :** ఒక బహుపదిలో పదాలన్ని “సున్నా” అయిన దానిని శూన్య బహుపది అంటారు.

☞ **బహుపది యొక్క శూన్య విలువ :** ఒక బహుపదిలో ఏ విలువను ప్రతిక్షేపిస్తే ఆ

బహుపది శూన్యమవుతుందో ఆ విలువను “బహుపది యొక్క శూన్యవిలువ” అంటారు.



బహుపదులు - రకాలు :

ఎ) రేఖీయ బహుపది : ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణము ఒకటి (1) అయిన దానిని 7“రేఖీయ బహుపది” అంటారు.

ఉదా: $2x+3$ బహుపది పరిమాణం = 1

బి) వర్గ బహుపది : ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణము రెండు (2) అయిన దానిని “వర్గ బహుపది” అంటారు. వర్గ బహుపది సాధారణ రూపము : $ax^2 + bx + c$

ఉదా: $5x^2 + 7x + 1$ బహుపది పరిమాణం = 2

సి) ఘన బహుపది : ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణము మూడు (3) అయిన దానిని “ఘన బహుపది” అంటారు.

ఉదా: $2x^3 - 5x^2 + 6x + 2$ బహుపది పరిమాణం = 3

డి) శూన్య బహుపది : ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణము సున్నా (0) అయిన దానిని “శూన్య బహుపది” అంటారు.

స్థిరపదం యొక్క పరిమాణము ఎల్లప్పుడు “సున్నా”

ఉదా: 2018 యొక్క పరిమాణము = 0



సంఖ్యా వాక్యము :

రెండు సంఖ్యా పదాలను $=, >, <, \neq$ గుర్తులచే ఏర్పడిన సంఖ్యా సమాసాలను “సంఖ్యా వాక్యము” అంటారు.

ఉదా|| $5+4=9$, $3-1 < 4$



సంఖ్యా ప్రవచనం :

ఒక సంఖ్య వచనం సత్యము లేదా అసత్యము అయ్యే వచనాలను “సంఖ్యా ప్రవచనాలు” అంటారు.

ఉదా: $4+3=7$ సత్యము

$8-2=16$ అసత్యము



గణిత ప్రవచనం :

బీజీయ సమాసాలను మరియు సంఖ్యా సమాసాలను $=, \neq, <, >, \neq$ గుర్తులను ఉపయోగించి వ్రాయగా ఏర్పడే ప్రవచనాలను “గణిత ప్రవచనాలు” అంటారు.

ఉదా : $2x+5=17$ $2x^2+3x > 10$ మొ||నవి



అనిశ్చిత వాక్యము :

సత్యమో, అసత్యమో నిర్ణయించలేని వాక్యాలను “అనిశ్చిత వాక్యములు” అంటారు.

ఉదా|| $x^2+7=5$ (సత్యము)



సమీకరణము :

సమానత్వము గుర్తు (“=”) కలిగిన ఒక అనిశ్చిత వాక్యమును “సమీకరణము” అంటారు.

ఉదా: $2x + 4 = 12$

$LHS = 2x + 4$

$RHS = 12$



సమీకరణ సాధన :

సమీకరణంలో గల చరరాశి విలువకు ఆ సమీకరణం తృప్తి చెందితే, ఆ విలువను దాని యొక్క ‘సాధన’ అంటారు.

ఉదా : $x - 3 = 4$ సాధించుము

జ. $x - 3 = 4$

$x = 4 + 3$

$x - 3 = 4$ యొక్క సాధన $x = 7$

$x = 7$



రేఖీయ సమీకరణము (సామాన్య సమీకరణము):

ఒక సమీకరణములోని చరరాశుల యొక్క గరిష్ట ఘాతాంకం ‘1’ అయితే ఆ సమీకరణమును “రేఖీయ సమీకరణము” అంటారు.

ఉదా: $a + 4 = 23$ $x + 1 = 4$ లలో పరిమాణము ‘1’



తరలించుట (లేదా) పక్షాంతరము)

ఒక సమీకరణములో ఏదైనా పదమును ఒకవైపు నుండి మరొక వైపునకు మార్చునపుడు వాని గుర్తులు మారును. ఈ పద్ధతిని ‘తరలించుట’ లేదా ‘పక్షాంతరము’ అంటారు.

+	=	-	(+ గుర్తు సమానత్వ గుర్తుకు ఆవలి వైపుకు వెళ్ళిన
-	=	+	- గుర్తుగా మారును)
×	=	÷	
÷	=	×	



అసమీకరణాలు :

ఒక అనిశ్చిత వాక్యము $>, \geq, <, \leq$ గుర్తు కలిగి ఉంటే వాటిని ‘అసమీకరణాలు’ అంటారు.

ఉదా: - (1) $5x - 4 > 12$ (2) $3P + 6 \leq 32$



రేఖీయ అసమీకరణాలు :

ఒక అసమీకరణము యొక్క గరిష్ట ఘాతాంకము ఒకటి (1) అయిన దానిని “రేఖీయ అసమీకరణము” అంటారు.

ఉదా :- (1) $5x - 3 \leq 10 - 3x$ (2) $2x + 10 \geq x + 5$



సూత్రములు :

సమీకరణ సమస్య సాధనలో తరచుగా ఉపయోగించే వాటిని “సూత్రములు” అంటారు.

ఉదా: - రాంబన్ వైశాల్యము $(A) = \frac{1}{2}d_1d_2$

ఒక దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యము దాని పొడవు, వెడల్పుల లబ్ధానికి సమానము. ప్రవచనము యొక్క సూత్ర రూపం

$$A = lb$$


‘A’ అనగా దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యము

l అనగా పొడవు

b అనగా వెడల్పు

$m \times n$ వల చిత్రములో చతురస్రముల సంఖ్య $= mn$

ఉదా||



$$\text{బిందువుల సంఖ్య} = (m+1)(n+1)$$

$$4 \times 3 \text{ వల చిత్రంలో చతురస్రాల సంఖ్య} = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{బిందువుల సంఖ్య} = (4+1)(3+1)$$

$$= 5 \times 4$$

$$= 20$$

$$'n' \text{ భుజాల గల బహుభుజి యొక్క కర్ణాల సంఖ్య} = \left[\frac{n(n-1)}{2} - n \right]$$

ఉదా|| 20 భుజాలు గల బహుభుజి యొక్క కర్ణాల సంఖ్య

$$= \frac{20(20-1)}{2} - 20$$

$$= 10 \cdot 19 - 20$$

$$= 190 - 20 = 170$$

$K \times K$ వల చిత్రము నందు గల మొత్తం చతురస్రాల సంఖ్య $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + K^2$

ఉదా: - 4×4 వల చిత్రంలోగల చతురస్రాల సంఖ్య $= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$

$$= 1 + 4 + 9 + 16$$

$$= 30$$



త్రిభుజాకార సంఖ్యలు 1, 3, 6, 10, 15 $\frac{n(n+1)}{2}$

1 త్రిభుజానికి 3 బిందువులు కావాలి

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \sum n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots n^2 = \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots n^3 = \sum n^3 = \left(\sum n \right)^2 \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4}$$



సర్వ సమీకరణము :

ఒక సమీకరణములోని చరరాశి విలువ అన్ని విలువలకు సత్యము అయితే ఆ సమీకరణాన్ని

“సర్వ సమీకరణము” అంటారు. దీనికి గుర్తు $\equiv$

$$\text{ఉదా॥ } 2(a+b) \equiv 2a+2b$$

సర్వ సమీకరణాలను ప్రత్యేక లభాలు అని కూడా అంటారు.

- ◆ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)(a+b)$
- ◆ $(a-b)^2 = (a^2 - 2ab + b^2) = (a-b)(a-b)$
- ◆ $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- ◆ $\frac{a^2 - b^2}{a+b} = a-b$
- ◆ $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2 = 2(a^2 + b^2)$
- ◆ $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$
- ◆ $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$
- ◆ $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$
- ◆ $x + \frac{1}{x} = a$ అయిన $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$
- ◆ $x - \frac{1}{x} = a$ అయిన $x^2 - \frac{1}{x^2} = a^2 + 2$
- ◆ $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ లేదా $a^3 + 3ab(a+b) + b^3$
- ◆ $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ లేదా $a^3 - 3ab(a-b) - b^3$
- ◆ $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$
(లేదా)
- ◆ $(a+b)(a^2 - ab + b^2)$

- ♦ $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
(లేదా)
 $= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- ♦ $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
- ♦ $a + b + c = 0$ అయిన $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- ♦ $a^{1/3} + b^{1/3} + c^{1/3} = 0$ అయిన $a + b + c = 3a^{1/3}b^{1/3}c^{1/3}$
(లేదా)
 $(a + b + c)^3 = 27abc$
- ♦ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$
- ♦ $a + b + c = 0$ లేదా $a = b = c$ అయిన $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- ♦ $ab + bc + ca = abc$ అయిన $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$
- ♦ $(x + a)(x + b) = x^2 + x(a + b) + ab$
- ♦ $(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$
- ♦ $(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + x^2(a + b + c) + x(ab + bc + ca) + abc$
- ♦ $x + \frac{1}{x} = a$ అయిన $x^3 + \frac{1}{x^3} = a^3 - 3a$
- ♦ $x - \frac{1}{x} = a$ అయిన $x^3 - \frac{1}{x^3} = a^3 + 3a$
- ♦ $x^{a+1} + \frac{1}{x^{a+1}} = \left(x^a + \frac{1}{x^a}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x^{a-1} + \frac{1}{x^{a-1}}\right)$
- ♦ a^n లో 'a'ను భూమి అని, 'n'ని ఘాతాంకము అని అంటారు
ఉదా|| $64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6$ $\xrightarrow{\text{భూమి}} \xrightarrow{\text{ఘాతాంకము}}$
- ♦ ఒక సంఖ్య యొక్క ఘాతాంకం 1 అయిన ఫలితం అదే సంఖ్య అవుతుంది అనగా
 $x^1 = x$
- ♦ ఒక సంఖ్య యొక్క ఘాతాంకం 2 అయిన ఆ సంఖ్యను “వర్గము” అంటారు.
ఉదా|| 5 యొక్క వర్గము $= 5^2$
- ♦ ఒక సంఖ్య యొక్క ఘాతాంకము 3 అయిన ఆ సంఖ్యను “ఘనము” అంటారు.
ఉదా|| 13 యొక్క ఘనము $= 13^3$

- ♦ 1 యొక్క ఘాతాంకము ఎంతైననూ దాని ఫలితం 1.
ఉదా|| $1^{71020111} = 1$
- ♦ -1 యొక్క ఘాతాంకము ధనజేసి సంఖ్య అయిన దాని ఫలితం $= -1$ అవుతుంది.
ఉదా|| $(-1)^{20100711} = -1$
- ♦ -1 యొక్క ఘాతాంకము ధన సరిసంఖ్య అయిన దాని ఫలితము 1 అవుతుంది.
ఉదా|| $(-1)^{2018} = 1$

ఘాతాంక న్యాయాలు :-

a, b లు శూన్యేతర పూర్ణ సంఖ్యలు

- ♦ $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ♦ $(a^m)^n = a^{mn}$
- ♦ $(ab)^m = a^m \cdot b^m$
- ♦ $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$
- ♦ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ($m > n$ అయిన)
- ♦ $\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}}$, ($m < n$ అయిన) $\frac{1}{a^{n-m}}$
- ♦ $\frac{a^m}{a^n} = 1$, ($m = n$ అయిన)
- ♦ $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- ♦ $a^0 = 1$, a శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్య
(గమనిక: $0^0 = 1$ కాదు ఎందుకనగా '0', '0'చే భాగించబడదు.

$$i.e. 0^0 = 0^{n-n} = \frac{0^n}{0^n} = \frac{0}{0} \text{ నిర్వచించబడదు})$$

- ♦ $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- ♦ $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

- ♦ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$
- ♦ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$
- ♦ $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$
- ♦ $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$
- ♦ $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ (a యొక్క n వ మూలము)
- ♦ $\sqrt[n]{a^n} = a^{n/n} = a^1 = a$
 $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ (a^m యొక్క n వ మూలము)
- ♦ $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- ♦ $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
- ♦ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
- ♦ $\sqrt[m]{an} = (\sqrt[n]{a})^n$

ప్రామాణిక రూపం:-

రెండు కారణరాశుల లబ్ధమే ప్రామాణిక రూపం ఇందు ఒక కారణాంకం 1 మరియు 10 మధ్య ఉంటుంది. రెండవ కారణాంకం 10 యొక్క ఘాతాంకం.

- ♦ ప్రామాణిక రూపం అనేది అతిపెద్ద, అతి చిన్న సంఖ్యలను సులభంగా గణించుటకు ఉపయోగిస్తారు.
- ♦ మొదటి కారణాంకం 1 మరియు 10 మధ్య ఉండేటట్లు ఎడమవైపు దశాంశ బిందువు వైపు కొన్ని స్థానాలు జరుగును.

రెండవ కారణాంక స్థానం 10 యొక్క ఘాతాంకంగా ఉంటుంది.

ఉదా॥ భూమి నుండి సూర్యుని మధ్యదూరం = 149,600,000,000 మీ॥ యొక్క ప్రామాణిక రూపం.

జ. ప్రామాణిక రూపం = 1.496×10^{11} మీ

ఉదా॥ 4.37×10^5 యొక్క సాధారణ రూపం

జ. $4.37 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$

జ. = 4,37,000

- ♦ రెండు ఏకపదుల లబ్ధం ఏకపది అవుతుంది.
- ♦ ఒక బహుపదిని ఏకపదిచే గుణించాలంటే బహుపదిలోని అన్ని పదాలను ఏకపది చే గుణించాలి.

ఉదా|| $(x^2 + 6x + 5)(-7x)$ ల లబ్ధం కనుగొనుము.

$$\text{జ. } (x^2 + 6x + 5)(-7x)$$

$$= x^2(-7x) + 6x(-7x) + 5(-7x)$$

$$= -7x^3 - 42x^2 - 35x$$

$$(+) \times (+) = +$$

$$(+) \times (-) = -$$

$$(-) \times (+) = -$$

$$(-) \times (-) = +$$

- ♦ ఒక సంఖ్యను ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాసే పద్ధతిని, ప్రధాన కారణాంక విభజన పద్ధతి అంటారు.

ఉదా|| 36 యొక్క ప్రధాన కారణాంకాలు

$$\text{జ. } 36 - 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$$

- ♦ ఇచ్చిన సమాసమును దాని కారణాంకాల లబ్ధంగా వ్రాయటాన్ని “కారణాంక విభజన” అంటారు.
- ♦ సూక్ష్మీకరణ సాధ్యంకాని కారణాంకమును ‘అవిభాజ్య కారణాంకం’ అంటారు.

గోల్డ్ బాక్ ఊహ:

ప్రతి బేసి సంఖ్య, ప్రధాన సంఖ్యగానో లేదా కొన్ని ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తంగా లేదా వర్గ సంఖ్యకు రెట్టింపు సంఖ్యగా ఉంటుంది.

$$\text{ఉదా|| } 21 = 19 + 2 \text{ లేదా } 13 + 2(4) \text{ లేదా } 3 + 2(9)$$

- ♦ గోల్డ్ బాక్ తన పరిశోధన 9000 సంఖ్య వరకు పరిశీలించాడు.
- ♦ వాటిలో కేవలం రెండు సంఖ్యలు మాత్రమే మినహాయింపు కలదు. ఎందుకనగా అవి ప్రధాన సంఖ్యలు కావు మరియు ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తం కాదు మరియు వర్గ సంఖ్యకు రెట్టింపు సంఖ్యకాదు.

$$(1) 5777 = 53 \times 109$$

$$(2) 5993 = 13 \times 641$$

కారణాంక విభజన విధానము :

- ♦ x^2 గుణకమును స్థిరరాశితో గుణించాలి.
- ♦ గుణించిన లబ్ధంను రెండు కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయాలి.

- ◆ స్థిరరాశి ముందు గుర్తు + అయిన ఆ కారణాంకాల మొత్తం x గుణకం కావాలి.
- ◆ స్థిరరాశి ముందు - అయిన ఆ కారణాంకాల భేదం x గుణకం కావాలి.
- ◆ x పదమును రెండు కారణాంకాల మొత్తంగా గాని, భేదంగా గాని రెండు పదాలుగా రాయాలి.
- ◆ నాలుగు పదాలను రెండు విభాగాలుగా చేసి వాటిని కారణాంకాలుగా మార్చాలి.

ఉదా: - $x^2 + 7x + 12$ యొక్క కారణాంకాలు

$$\begin{aligned}
 \text{జ. } x^2 + 7x + 12 & \quad (\because 1 \times 12 = 2 \times 6) \\
 x^3 + 3x + 4x + 12 & \quad = 3 \times 4 \\
 x(x+3) + 4(x+3) & \quad 7x = 3x + 4x \\
 (x+3)(x+4) &
 \end{aligned}$$

- ◆ ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణము ఎంత ఉంటే దానికి అన్ని కారణాంకాలు వుంటాయి.

మాదిరి ప్రశ్నలు

1. $5x - 8 = 3x + 22$ సాధించండి.

$$\begin{aligned}
 \text{జ. } 5x - 8 &= 3x + 22 \\
 \Rightarrow 5x - 3x &= 22 + 8 \\
 \Rightarrow 2x &= 30 \\
 \Rightarrow x &= \frac{30}{2} \\
 \therefore x &= 15
 \end{aligned}$$

2. $-2x^2 - (-x^2 + 4x)$ సూక్ష్మీకరించండి.

$$\begin{aligned}
 \text{జ. } -2x^2 - (-x^2 + 4x) \\
 = -2x^2 + x^2 - 4x \\
 = -x^2 - 4x \\
 = -(x^2 + 4x)
 \end{aligned}$$

3. $x = -1$ వద్ద $(1 + x^{92})(1 - x^{141})$ విలువ ?

$$\text{జ. } x = -1 \text{ వద్ద } (1 + x^{92})(1 - x^{141})$$

$$\begin{aligned}
&= (1+(-1)^{92})(1-(-1)^{141}) \\
&= (1+1)(1-(-1)) \\
&= 2(1+1) \\
&= 2 \times 2 \\
&= 4
\end{aligned}$$

4. a, b, c లు మూడు వాస్తవ సంఖ్యలు, $a - 7b + 8c = 4$ మరియు $8a + 4b - c = 7$ అయిన $a^2 - b^2 + c^2$ విలువ ఎంత ?

జ.

$$\begin{aligned}
1. \quad &a - 7b + 8c = 4 \\
&\rightarrow a + 8c = 4 + 7b \text{ (ఇ.వర్గం చేయగా)} \\
&\Rightarrow a^2 + 16ac + 64c^2 = 16 + 56b + 49b^2 \quad (1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2. \quad &8a + 4b - c = 7 \\
&\Rightarrow 8a - c = 7 - 4b \text{ (ఇ. వర్గం చేయగా)} \\
&\Rightarrow 64a^2 - 16ac + c^2 = 49 - 56b + 16b^2 \quad (2)
\end{aligned}$$

(1) (2)లను కలుపగా

$$(1) \rightarrow a^2 + 16ac + 64c^2 = 16 + 56b + 49b^2$$

$$\begin{aligned}
(2) \rightarrow &\underline{64a^2 - 16ac + c^2 = 49 - 56b + 16b^2} \\
&65a^2 + 65c^2 = 65 + 65b^2 \\
&65(a^2 + c^2) = 65(1 + b^2)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow a^2 + c^2 = 1 + b^2 \Rightarrow a^2 - b^2 + c^2 = 1$$

5. $P = 3^{2018} + 3^{-2018}$ మరియు $Q = 3^{2018} - 3^{-2018}$ అయిన $P^2 - Q^2 = ?$

జ. $P = 3^{2018} + 3^{-2018} = 3^{2018} + \frac{1}{3^{2018}}$

$$3^{2018} = a \text{ అనుకొనుము}$$

$$P = a + \frac{1}{a} \Rightarrow P^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$$

$$Q = a - \frac{1}{a} \Rightarrow Q^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} - 2$$

$$P^2 - Q^2 = 4$$

6. $8^{x+2} = 2^{4x-3}$ అయిన $x = -$

$$8^{x+2} = 2^{4x-3}$$

$$\Rightarrow (2^3)^{x+2} = 2^{4x-3}$$

$$\Rightarrow 2^{3x+6} = 2^{4x-3}$$

భూములు సమానం కావున ఘాతాంకాలు సమానం.

$$\Rightarrow 3x + 6 = 4x - 3$$

$$\Rightarrow 4x - 3x = 6 + 3$$

$$x = 9$$

7. మూడెంకల సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం 9. సంఖ్యలో నుండి 27 తీసివేయగా అది ఆ సంఖ్యలోని అంకెలను తారుమారు చేయగా వచ్చిన దానికి సమానం. అయిన ఆ సంఖ్యలు ఏవి ?

జ) ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె $= x$

పదుల స్థానంలోని అంకె $= 9 - x$, (అంకెల మొత్తం $= 9$)

$$\text{సంఖ్య} = 10(9 - x) + x = 90 - 10x + x = 90 - 9x$$

లెక్క ప్రకారం

$$\Rightarrow 9x + 9 = 90 - 9x - 27$$

$$\Rightarrow 9x + 9x = 90 - 9 - 27$$

$$\Rightarrow 18x = 54$$

$$\Rightarrow x = \frac{54}{18}$$

$$\Rightarrow x = 3$$

ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె $x = 3$

పదుల స్థానంలోని అంకె $= 9 - x = 9 - 3 = 6$

$$\text{సంఖ్య} = 63$$

8. 16 సం॥ల తరువాత ఒక వ్యక్తి వయస్సు 16 సం॥ల ముందు వయస్సుకి 9 రెట్లు అయిన 5సం॥ల తరువాత అతని వయస్సు ఎంత ?

జ) ప్రస్తుత వయస్సు $= x$ సం॥లు

$$16\text{సం॥ తరువాత వయస్సు} = (x + 16)\text{సం॥}$$

$$16\text{సం॥ క్రితం వయస్సు} = (x - 16)\text{సం॥}$$

లెక్క ప్రకారం

$$\Rightarrow x + 16 = 9(x - 16)$$

$$\Rightarrow x + 16 = 9x - 144$$

$$\Rightarrow 9x - x = 144 + 16$$

$$\Rightarrow 8x = 160$$

$$x = \frac{160}{8} \Rightarrow x = 20$$

$$5\text{సం॥తరువాత ఆ వ్యక్తి వయస్సు} = x + 5$$

$$= 20 + 5$$

$$= 25\text{సం॥లు}$$

$$9. \frac{3^8(11111)^4}{(33333)^4} \text{ విలువ ఎంత ?}$$

$$\text{జ) } \frac{3^8(11111)^4}{(33333)^4} = 3^8 \left(\frac{1}{3} \right)^4 = \frac{3^8}{3^4} = 3^{8-4} = 3^4 = 81$$

$$10. 3^n = 27 \text{ అయిన } 3^{n-2} =$$

$$\text{జ) } 3^n = 27$$

$$3^{n-2} = \frac{3^n}{3^2} = \frac{27}{9} = 3 \left(\because a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n} \right)$$

$$11. \frac{3x}{2} + \frac{x}{3} = x + \frac{x}{6} + 6 \text{ సాధించండి.}$$

$$\text{జ) } \frac{3x}{2} + \frac{x}{3} = x + \frac{x}{6} + 6$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{2} + \frac{x}{3} - x - \frac{x}{6} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{9x + 2x - 6x - x}{6} = 6$$

$$\Rightarrow 11x - 7x = 36$$

$$\Rightarrow 4x = 36$$

$$x = \frac{36}{4}$$

$$x = 9$$

12. రెండు వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తం 164. అయిన ఆ సంఖ్యలు ఏవి?

జ) రెండు వరుస బేసి సంఖ్యలు సంఖ్యలు x మరియు $x+2$ అనుకొనుము.

$$\text{వాటి మొత్తం} = x + (x+2) = 164$$

$$\Rightarrow 2x + 2 = 164$$

$$\Rightarrow 2x = 164 - 2$$

$$\Rightarrow 2x = 162$$

$$x = \frac{162}{2}$$

$$x = 81$$

$$x + 2 = 81 + 2 = 83$$

ఆ సంఖ్యలు 81 మరియు 83

13. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$ అయిన $x^2 - \frac{1}{x^2}$ విలువ కనుగొనుము.

$$\text{జ) } x^2 \frac{1}{x^2} = 2 \Rightarrow (x^2) + \left(\frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 0$$

$$= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 0 \quad x = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow x - \frac{1}{x} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = 1$$

$$x = \sqrt{1} = \pm 1$$

$$x = 1 \text{ అయిన } x^2 - \frac{1}{x^2} = 1^2 - \frac{1}{1^2} = 1 - 1 = 0$$

$$x = -1 \text{ అయిన } x^2 - \frac{1}{x^2} = (-1)^2 - \frac{1}{(-1)^2} = 1 - 1 = 0$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 2 \text{ అయిన } x^2 - \frac{1}{x^2} = 0$$

14. బారువడ్డీ $I = \frac{PTR}{100}$ సూత్రము నుండి T ను కర్తగా రాయండి.

$$\text{జ) బారువడ్డీ } I = \frac{PTR}{100}$$

$$\Rightarrow PTR = 100I$$

$$\therefore T = \frac{100I}{PR}$$

15. a, b లు రెండు ధన పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు $a^b = 125$ అయిన $(a-b)^{a+b-4}$ విలువ ఎంత ?

$$\text{జ) } a^b = 125 = 5^3$$

$$\Rightarrow a = 5$$

$$b = 3$$

$$(a-b)^{a+b-4} = (5-3)^{5+3-4} = 2^{8-4} = 2^4 = 16$$

16. $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{-3/2} = 5^{a+2}$ అయిన ' a ' విలువ ఎంత ?

$$\text{జ. } 5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{-3/2} = 5^{a+2}$$

$$5^1 \cdot 5^{1/2} \times \frac{5^3}{5^{-3/2}} = 5^{a+2}$$

$$\Rightarrow 5^{3/2} \times 5^3 \times 5^{3/2} = 5^{a+2}$$

$$\Rightarrow 5^{\frac{3}{2}+3+\frac{3}{2}} = 5^{a+2}$$

భూములు సమానం కావున ఘాతాంకాలు సమానము.

$$\Rightarrow \frac{3}{2} + 3 + \frac{3}{2} = a + 2 \Rightarrow \frac{3+6+3}{2} = a + 2$$

$$\Rightarrow \frac{12}{2} = a + 2$$

$$\Rightarrow a + 2 = 6$$

$$\Rightarrow a = 6 - 2$$

$$\Rightarrow a = 4$$

17.
$$\frac{(2018^2 - 2024)(2018^2 + 4036 - 3)2019}{(2015) \times (2017)(2020)(2021)}$$

$$\text{జ. } \frac{(2018^2 - 2024)(2018^2 + 4036 - 3)2019}{(2015) \times (2017)(2020)(2021)} = \frac{[(2018^2 - 9) - 2015][2018^2 + 2(2018) + 1 - 4]^{2019}}{2015 \times 2017 \times 2020 \times 2021}$$

$$= \frac{[(2018 + 3)(2018 - 3) - 2015][(2018 + 1)^2 - 2^2]2019}{2015 \times 2017 \times 2020 \times 2021}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{[(2021 \times 2015) - 2015](2019 + 2)(2019 - 2) \cdot 2019}{2015 \times 2017 \times 2020 \times 2021} \\
&= \frac{2015(2021 - 1) \times 2021 \times 2017 \times 2019}{2015 \times 2017 \times 2020 \times 2021} \\
&= \frac{2020 \times 2019}{2020} \\
&= 2019
\end{aligned}$$

18. రెండు సంఖ్యల లబ్ధం 21 మరియు వాటి భేదం 4 అయిన వాటి ఘనముల మొత్తానికి వాటి ఘనముల భేదానికి గల నిష్పత్తి కనుగొనుము.

జ) రెండు సంఖ్యలు $= x$ మరియు y అనుకొనుము.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధం : $xy = 21$

రెండు సంఖ్యల భేదం : $x - y = 4$ (1)

$$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$$

$$= (4)^2 + 4(21)$$

$$= 16 + 84$$

$$100$$

$$\therefore x + y = \sqrt{100} = 10$$

$$x + y = 10$$
 (2)

(1) (2) ల నుండి

$$x - y = 4$$

$$x + y = 10$$

$$x + y = 10$$

$$x - y = 4$$

$$2x = 14$$

$$2y = 6$$

$$x = \frac{14}{2}$$

$$y = \frac{6}{2}$$

$$x = 7$$

$$y = 3$$

$\therefore$ ఆ సంఖ్యలు 7 మరియు 3

7 మరియు 3ల ఘనాల మొత్తం $7^3 + 3^3 = 343 + 27 = 370$

7 మరియు 3ల ఘనాల భేదం $= 7^3 - 3^3 = 343 - 27 = 316$

వాటి నిష్పత్తి : 370 : 316

$$= 185 : 158$$

19. $a^x = \sqrt{b}, b^y = \sqrt[3]{c}$ మరియు $c^z = \sqrt{a}$ then find xyz

జ) $a^x = \sqrt{b}$ $b^y = \sqrt[3]{c}$

$a^x = (b)^{1/2}$ $b^y = (c)^{1/3}$

$a = (b)^{\frac{1}{2x}}$ $b = c^{\frac{1}{3y}}$

అయితే $c^z = \sqrt{a}$

$c^z = (a)^{\frac{1}{2}}$

$c^z = \left(b^{\frac{1}{2x}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\left(c^{\frac{1}{3y}} \right)^{\frac{1}{2x}} \right)^{\frac{1}{2}} = c^{\frac{1}{12xy}}$

$z = \frac{1}{12xy} \Rightarrow 12xyz = 1$

$xyz = \frac{1}{12}$

20. $x = 5 + 2\sqrt{6}$ అయితే $x + \frac{1}{x}$ కనుగొనుము.

జ) $x = 5 + 2\sqrt{6}$

$\frac{1}{x} = \frac{1}{5 + 2\sqrt{6}} \times \frac{5 - 2\sqrt{6}}{5 - 2\sqrt{6}} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{(5)^2 - (2\sqrt{6})^2} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{25 - 24} = 5 - 2\sqrt{6}$

$x + \frac{1}{x} = 5 + 2\sqrt{6} + 5 - 2\sqrt{6} = 10$

21. $a^3 + 3a^2 + 3a + 2 = 0$ అయితే $(a+1)^{2018} + (a+1)^{2019} + (a+1)^{2020}$ కనుగొనుము.

జ) $a^3 + 3a^2 + 3a + 2 = 0$

$a^3 + 3a^2 + 3a + 1 + 1 = 0$

$(a+1)^3 + 1 = 0$

$(a+1)^3 = -1 \Rightarrow a+1 = -1$

$(a+1)^{2018} + (a+1)^{2019} + (a+1)^{2020} = (-1)^{2018} + (-1)^{2019} + (-1)^{2020}$

$= 1 + (-1) + 1$

$= 2 - 1 = 1$

22. $x = a(b-c), y = b(c-a)$ మరియు $z = c(a-b)$ అయితే $\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3$

కనుగొనుము

జ) $\frac{x}{a} = b-c \quad \frac{y}{b} = c-a \quad \frac{z}{c} = a-b$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3 = (b-c)^3 + (c-a)^3 + (a-b)^3 \quad (a+b+c=0 \text{ అయితే})$$

$$= 3(a-b)(b-c)(c-a) \quad a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$= 3 \cdot \frac{z}{c} \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{y}{b} = \frac{3xyz}{abc}$$

23. $\frac{154}{69} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d}}}$ అయితే $(c+d) - (a+b) = \dots\dots$ విలువ ఎంత ?

జ. $\frac{154}{69} = 2 + \frac{16}{69} = 2 + \frac{1}{\frac{69}{16}} = 2 + \frac{1}{4 + \frac{5}{16}} = 2 + \frac{1}{4 + \frac{16}{5}}$

$$= 2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5}}}$$

$$a = 2, b = 4, c = 3, d = 5$$

$$(c+d) - (a+b) = (3+5) - (2+4) = 8 - 6 = 2$$

24. $x^2 + xy = 20$ మరియు $y^2 + xy = 30$ అయిన xy విలవను కనుగొనుము.

జ. $x^2 + xy + y^2 + xy = 20 + 30$

$$x^2 + 2xy + y^2 = 50$$

$$(x+y)^2 = 50$$

$$(x^2 + xy)(y^2 + xy) = 20 \times 30$$

$$x(x+y)y(x+y) = 600$$

$$xy(x+y)^2 = 600$$

$$xy(50) = 600$$

$$xy = \frac{600}{50}$$

$$xy = 12$$

బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు

1. $3x^7 + 5x^6 - 2x^5 + 10x^2$ యొక్క బహుపది పరిమాణం ()
ఎ) 8 బి) 7 సి) 6 డి) 3
2. $2x - 2\left(x - \frac{1}{2}\right) = \dots$ ()
ఎ) x బి) $2x$ సి) 2 డి) 1
3. ఒక సంఖ్య యొక్క ముందు మరియు తరువాత సంఖ్యల మొత్తం 116 అయిన ఆ సంఖ్య ()
ఎ) 58 బి) 59 సి) 57 డి) 60
4. ఒక చతురస్ర వైశాల్యం $A = S^2$ మరియు $A = 324$ చ.సెం.మీ అయిన $S =$ ()
ఎ) 162 బి) $(324)^2$ సి) 18 డి) 16
5. $2x - 5 > 4x - 3$ ను తృప్తిపరచే విలువ ()
ఎ) 0 బి) 1 సి) -1 డి) -2
6. $3(4m + 5) - 4(3 - 2m) = 13$ అయిన $m =$ ()
ఎ) $\frac{1}{2}$ బి) 2 సి) $\frac{1}{4}$ డి) 1
7. $x = 2$ మరియు $y = 4$ అయిన $x^{x/y} \cdot y^{x/y}$ ()
ఎ) 2 బి) 4 సి) $2^{2/3}$ డి) $2^{3/2}$
8. $(-1)^0 + (-1)^1 + (-1)^2 + \dots + (-1)^{100} =$ ()
ఎ) 0 బి) 1 సి) 2 డి) 4
9. $(2^3)^4 = \dots$ ()
ఎ) 2^4 బి) (2^{3^4}) సి) $(2^4)^3$ డి) 2^7
10. $a + b + c = 0$ అయిన $\sqrt{x^a \cdot x^b \cdot x^c} = \dots$ ()
ఎ) 0 బి) 1 సి) -1 డి) x^3
11. $3^x = 6561$ అయిన 3^{x-3} విలువ ()
ఎ) 81 బి) 243 సి) 729 డి) 27
12. $(5^0 + 6^0) \times 2^0 - 7^0 =$ ()
ఎ) 0 బి) 11 సి) 15 డి) 1

13. $(a-1)(a^2-2a+1)=...$ ()
 ఎ) $(a-1)^2$ బి) $(a-1)^3$ సి) a^2-1 డి) 1
14. $y+\frac{1}{2y}=4$ అయిన $y^2+\frac{1}{4y^2}=$ ()
 ఎ) 15 బి) 16 సి) 18 డి) 10
15. $2x+3$ యొక్క బహుపది శూన్య విలువ ()
 ఎ) -2 బి) -3 సి) $-\frac{3}{2}$ డి) $-\frac{2}{3}$
16. $496 \times 492 = x^2 - 4, (x > 0)$ అయిన x విలువ ()
 ఎ) 495 బి) 494 సి) 493 డి) 496
17. $46 \times \boxed{46} + 54 \times 54 + 2 \times 46 \times 54 = \dots$ ()
 ఎ) 9996 బి) 10004 సి) 9800 డి) 10000
18. $5a - \frac{\boxed{}}{8a-3b} 5a - 6b$ యొక్క చుట్టు కొలత ()
 ఎ) $26a-18b$ బి) $24a-18b$ సి) $26a+18b$ డి) $22a+16b$
19. $x=6, y=12$ మరియు $z=-3$ అయిన $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} - \frac{z}{3} = \dots$ ()
 ఎ) 2 బి) 3 సి) 6 డి) 7
20. a, b, c, d లు 3 యొక్క మొదటి నాలుగు ఘాతాంకాలు మరియు x, y, z లు మొదటి 3 సహజ సంఖ్యలు అయిన $a^{y-x} b^{z-y} c^{z-x} d^{x+y+z}$ ()
 ఎ) 3^{30} బి) 3^{33} సి) 3^{32} డి) 3^{34}
21. $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ మరియు $s = \frac{1}{2}(a+b+c), a=85, b=40, c=75$
 అయిన ప్రతిభుజ వైశాల్యము $A = -$ ()
 ఎ) 1475 బి) 1516 సి) 1500 డి) 1600
22. $x=2, y=1.15, z=0.01$ అయిన $xy(x^2+y^2)=-$ ()
 ఎ) 0.10276 బి) 0.1058 సి) 12.24175 డి) 0.12572
23. $3x^2y^5z^4$ యొక్క పరిమాణము = - ()
 ఎ) 2 బి) 11 సి) 4 డి) 5
24. $(256)^{0.16} \times (256)^{0.09} = -$ ()
 ఎ) 256 బి) 64 సి) 16 డి) 4

25. $[1+2^2+3^3+4^4+\dots+100^{100}]^0 = -$
 ఎ) 0 బి) 1 సి) 100 డి) 100^{100}
26. $\left[\left(\frac{-4}{3}\right)^{-3}\right]^2$ విలువ - ()
 ఎ) $\frac{3}{4}$ బి) $-\frac{3}{4}$ సి) $\frac{1024}{243}$ డి) $\frac{729}{4096}$
27. $(1+x)^{1+x^2+2x} = 4^{16}$ అయిన 'x' విలువ - ()
 ఎ) 1 బి) 2 సి) 3 డి) 25
28. $\frac{8^8(11111)^4}{(88888)^4} = -$ ()
 ఎ) 2796 బి) 4396 సి) 4096 డి) 1824
29. $a^{x-y+1}a^{y-z+1}a^{z-x+1} = -$ ()
 ఎ) a^3 బి) a^4 సి) a డి) a^2
30. $[1^3+2^3+3^3+4^3]^{\frac{-3}{2}}$ యొక్క విలువ - ()
 ఎ) 4000 బి) $\frac{1}{4000}$ సి) 100 డి) $\frac{1}{1000}$
31. $8^{x+2} = 2^{4x-3}$ అయిన $x = -$ ()
 ఎ) 5 బి) 9 సి) 7 డి) 6
32. $m=3, n=2$ అయిన $2m^3+3n^2-5m^2n = -$ ()
 ఎ) -24 బి) 26 సి) 24 డి) -26
33. $x^y = y^x$ అయిన $\left(\frac{x}{y}\right) = \dots\dots\dots$ ()
 ఎ) $x^{x/y}$ బి) $x^{\frac{x-y}{y}}$ సి) $\frac{y}{x^x}$ డి) $\frac{y-x}{x^x}$
34. 0.0084ను ప్రామాణిక రూపంలో రాయగా ()
 ఎ) 84×10^{-4} బి) 8.4×10^{-3} సి) 0.84×10^{-2} డి) 840×10^{-1}
35. $3x^2+4x+a=18$ మరియు $x=-1$ అయిన 'a' విలువ ()
 ఎ) 17 బి) 18 సి) 19 డి) 20

36. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^c \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^a \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^b =$ ()
 ఎ) 0 బి) 1 సి) 2 డి) 3
37. $x=6, y=12$ మరియు $z=-3$ అయిన $\frac{3x}{2} + \frac{y}{4} - \frac{z^2}{3} =$ ()
 ఎ) 2 బి) 3 సి) 6 డి) 9
38. $p+q+r=124$, $p-q=26$ మరియు $q-r=7$ అయిన p, q, r ల క్రమము ()
 ఎ) 35, 61, 28 బి) 61, 28, 35 సి) 28, 35, 61 డి) 61, 35, 28
39. $7 - \{3x - (4x - 5) - 3\} = 0$ అయిన x విలువ ()
 ఎ) -3 బి) -4 సి) -6 డి) -5
40. x ను 4 చే భాగించి 13 కలుపగా ఫలితం 33 అయిన $x =$ ()
 ఎ) 20 బి) 46 సి) 80 డి) 113
41. P యొక్క వర్గము మరియు P కి 4 రెట్లకన్నా 3 ఎక్కువ లబ్ధి సమీకరణము ()
 ఎ) $P^2 \times (4P + 3)$ బి) $P^2 \times (3P + 4)$ సి) $P^2 \times (4P - 3)$ డి) $P^2 \times (3P - 4)$
42. $\frac{m}{5} = 6$ మరియు $P - 4 = 8$ అయిన $m + P$ విలువ ()
 ఎ) 43 బి) 41 సి) 42 డి) 44
43. $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ లో F ను కర్తగా రాయగా ఫలితం ()
 ఎ) $F = \frac{5}{9}C + 32$ బి) $F = \frac{5}{9}C - 32$ సి) $F = \frac{5}{9}C \pm 32$ డి) $F = \frac{9}{5}C + 32$
44. నాలుగు వరుస పూర్ణ సంఖ్యల మొత్తం 70. అయిన వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ()
 ఎ) 19 బి) 23 సి) 17 డి) 16
45. 1 మీ 75 సెం.మీ పొడవుగల రిబ్బను $3\frac{4}{7}$ సెం.మీ కొలతలుగల ముక్కలుగా ()
 కత్తిరించిన వచ్చు మొత్తం ముక్కల సంఖ్య =
 ఎ) 49 బి) 50 సి) 51 డి) 52
46. $a - b = 2$ అయిన $a^2 + 2b - 4$ విలువ 'b' లో వ్రాయగా ()
 ఎ) $b^2 - 6b + 4$ బి) $b^2 + 4b$ సి) $b^2 + 6b$ డి) $b^2 + 6b - 4$

47. $A = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$ మరియు $B = \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$ అయిన $A+B =$ ()
 ఎ) $\frac{197}{20}$ బి) $\frac{189}{20}$ సి) $\frac{191}{20}$ డి) $\frac{193}{20}$
48. 25000 సంఖ్య యొక్క ఘనములో వచ్చు మొత్తం సున్నాల సంఖ్య ()
 ఎ) 27 బి) 9 సి) 6 డి) 25
49. $2x+1=5$ కి సమానమైన సర్వసమీకరణము ()
 ఎ) $3x+1=5$ బి) $x=4$ సి) $6x+3=15$ డి) $4x+2=16$
50. $x + \frac{1}{x} = 6$ అయిన $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ ()
 ఎ) 34 బి) 36 సి) 32 డి) 38
51. స్థిరరాశి యొక్క పరిమాణము ()
 ఎ) 1 బి) 2 సి) 0 డి) నిర్వచింపబడును
52. $A = x^2 + x + 1, B = x^2 - x + 1$ అయిన $A+B =$ ()
 ఎ) $2x^2 + 1$ బి) $2x^2 + 2$ సి) $2x^2 - 2x + 2$ డి) $2x^2 + 2x + 2$
53. $x+2$ యొక్క సంకలన విలోమము ()
 ఎ) $2x$ బి) $-x+2$ సి) $x-2$ డి) $-x-2$
54. $P = 3x - 4y - 8Z, Q = -10y + 7x + 11Z, R = 19Z - 6y + 4x$ అయిన ()
 $P - Q + R = \dots$
 ఎ) $13x - 20y + 16Z$ బి) $x + y + z$ సి) 0 డి) $2x - 4y + 3z$
55. $x=5$ మరియు $y = x + 7$ అయిన $\sqrt{x^2 + y^2} =$ ()
 ఎ) 13 బి) 17 సి) 26 డి) 65
56. $a^4 - 8a^2b^2 + b^4$ కంటే $a^4 + 4a^2b^2 + b^4$ ఎంత ఎక్కువ ()
 ఎ) $12ab^2$ బి) $12a^2b^2$ సి) $2a^4 + 2b^4$ డి) $12ab^2$
57. $ab=1$ అయిన $\frac{1}{1+a^{-1}} + \frac{1}{1+b^{-1}} =$ ()
 ఎ) 0 బి) $a+b$ సి) 1 డి) $a-b$
58. $a+b+c=22$ మరియు $ab+bc+ca=54$ అయిన $a^2+b^2+c^2 =$ ()
 ఎ) 376 బి) 75 సి) 377 డి) 375

59. $a + b = 11$ మరియు $ab = 30$ అయిన $a - b =$ ()

- ఎ) -1 బి) 2 సి) 330 డి) 19

60.
$$\frac{bx(a^2x^2 + 2a^2y^2 + b^2y^2) + ay(a^2x^2 + 2b^2x^2 + b^2y^2)}{(ax + by)^2}$$
 ()

- ఎ) $a(x + y)$ బి) $bx + ay$ సి) $ax + by$ డి) $b(x + y)$

61. $C = \frac{x-a}{x-b}$ అయిన $x =$ ()

- ఎ) $\frac{bc-a}{c-1}$ బి) $\frac{c-a}{c-b}$ సి) $\frac{c+a}{c+b}$ డి) $\frac{1-c}{a-bc}$

62. $\frac{x-a}{b+c} + \frac{x-b}{c+a} + \frac{x-c}{a+b} = 3$ అయిన $x = \dots$ ()

- ఎ) abc బి) $\frac{1}{abc}$ సి) $a + b + c$ డి) $\frac{1}{a + b + c}$

63. $5^m = 125$ లో 'm' విలువ.... ()

- ఎ) 3 బి) 6 సి) 2 డి) 4

64. $p^3q^3 + p^2q + p^4$ యొక్క బహుపది పరిమాణము ()

- ఎ) 4 బి) 5 సి) 6 డి) 3

65. ఒక చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత $6x + 2$ అయిన భుజం ... ()

- ఎ) $\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ బి) $3x + 1$ సి) $\frac{1}{2}x + 1$ డి) $24x + 8$

66. $x^2 - 1$ యొక్క కారణాంకం కానిది ()

- ఎ) $x - 1$ బి) $x + 1$ సి) 2 డి) $x^2 - 1$

67. $\frac{y+6}{5} = 14 + y$ అయిన $y =$ ()

- ఎ) -14 బి) 16 సి) -16 డి) 5

68. $\left[\left(\frac{-2}{3} \right)^{-2} \right]^2$ విలువ ()

- ఎ) $5\frac{1}{6}$ బి) $5\frac{1}{16}$ సి) $4\frac{7}{16}$ డి) $\frac{9}{16}$

69. $6x^2 - x - 15$ యొక్క ఒక కారణాంకం $(2x+3)$ అయిన రెండవది ()
 ఎ) $3x-5$ బి) $3x+5$ సి) $5x-3$ డి) $2x-3$
70. $x^2 + 6x + 9 = (x+3)(x-a)$ అయిన $a =$ ()
 ఎ) -3 బి) 3 సి) 2 డి) -2
71. $(.9)^2 + (.1)^2 + 2(.09) = \dots$ ()
 ఎ) $.1$ బి) $.9$ సి) 2 డి) 1
72. $13^x = 169$ అయిన $x = \dots$ ()
 ఎ) 2 బి) 13 సి) 3 డి) 1
73. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = x^2$ అయిన $x = \dots$ ()
 ఎ) 5 బి) 7 సి) 10 డి) 15
74. 6వ త్రిభుజ సంఖ్య ()
 ఎ) 6 బి) 10 సి) 21 డి) 28
75. $x + y = 8$ మరియు $xy = 15$ అయిన $x^2 + y^2 = \dots$ ()
 ఎ) 32 బి) 34 సి) 36 డి) 38
76. $\frac{6.4 \times 6.4 - 3.6 \times 3.6}{6.4 - 3.6} = \dots$ ()
 ఎ) 10 బి) 2.8 సి) 12 డి) 4.6
77. $A = 5m + 11n - 15p$, $B = 12m - 13n + 19p$, $C = 7m - 6n + 21p$ అయిన ()
 $A + B - C = \dots$
 ఎ) $24m - 8n + 25p$ బి) $10m + 4n - 17p$
 సి) $17m - 2n + 4p$ డి) $12m + 5n - 4p$
78. $x^2 - 2y + xy - 4$ యొక్క కారణాంకాలు ()
 ఎ) $(x-2)$ మరియు $(x+2+y)$ బి) $(x+2)$ మరియు $(x+2-y)$
 సి) $(x-y)$ మరియు $(x+2y-1)$ డి) $(x+y)$ మరియు $(x-2y+2)$
79. $(2x+3y)^2 - (2x-3y)^2 =$ ()
 ఎ) $6xy$ బి) $12xy$ సి) $18xy$ డి) $24xy$
80. 'n' అనేది ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్య $n(n+1)(n+2)$ అనేది ()
 ఎ) n సరి సంఖ్య అయినపుడు మాత్రమే సరి సంఖ్య అవుతుంది
 బి) n బేసి సంఖ్య అయినపుడు మాత్రమే సరి సంఖ్య అవుతుంది
 సి) n బేసి సంఖ్య అయినపుడు బేసి సంఖ్య అవుతుంది.
 డి) n సరి సంఖ్య అయిన అది 4చే భాగించబడుతుంది.

ప్రాక్టీస్ బిట్స్ - 2

1. $1 - \frac{1}{1 + \frac{a}{1-a}}$ యొక్క సూక్ష్మరూపం ()
 ఎ) a , if $a \neq 0$ బి) 1 సి) a , if $a \neq -1$
2. $a^x = c^q = b$, $c^y = a^z = b$ అయిన ()
 ఎ) $xy = qz$ బి) $\frac{x}{y} = \frac{q}{z}$ సి) $x + y = q + z$ డి) $x - y = q - z$
3. $\frac{1}{1+a^{n-m}} + \frac{1}{1+a^{m-n}} =$ ()
 ఎ) 0 బి) $\frac{1}{2}$ సి) 1 డి) a^{m+n}
4. $\frac{1}{1+x^{b-a}+x^{c-a}} + \frac{1}{1+x^{a-b}+x^{c-b}} + \frac{1}{1+x^{b-c}+x^{a-c}} =$ ()
 ఎ) 0 బి) 1 సి) x^{a-b-c} డి) x^{a+b+c}
5. $lmn=1$ అయిన $\frac{1}{1+l+m^{-1}} + \frac{1}{1+m+n^{-1}} + \frac{1}{1+n+l^{-1}} =$ ()
 ఎ) lmn బి) $l+m+n$ సి) 1 డి) 0
6. ఒక గది పొడవు 9.0085×10^{-2} సెం.మీ అయిన ఈ క్రింది వానిలో గది పొడవుకు సరియైనది ()
 ఎ) 0.90085 సెం.మీ బి) 0.090085 సెం.మీ
 సి) 900.85 సెం.మీ డి) 9008.5 సెం.మీ
7. $\sqrt{\frac{8^{10} + 4^{10}}{64^2 + 4^9 \times 16}} = \dots$ ()
 ఎ) 8 బి) 16 సి) 36 డి) 256
8. $a^x = \sqrt{b}, b^y = \sqrt[3]{C}$ మరియు $C^z = \sqrt{a}$ అయిన $xyz = \dots$ ()
 ఎ) $\frac{1}{2}$ బి) $\frac{1}{3}$ సి) $\frac{1}{6}$ డి) $\frac{1}{12}$
9. $(-7)^{-1}$ ను ఏ సంఖ్యచే గుణించిన ఫలితం 10^{-1} వస్తుంది ()
 ఎ) $-\frac{7}{10}$ బి) $-\frac{10}{7}$ సి) $\frac{7}{10}$ డి) $\frac{10}{7}$

10. $4^x - 4^{x-1} = 24$ అయిన $2x$ విలువ ()
 ఎ) 5 బి) 4 సి) 3 డి) 2
11. $\frac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 125}{5^{-7} \times 6^{-5}}$ ()
 ఎ) 5^2 బి) 5^3 సి) 5^4 డి) 5^5
12. $\frac{a+b-c}{c} = \frac{a-b+c}{b} = \frac{-a+b+c}{a} = 1$ అయిన $\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} =$ ()
 ఎ) 0 బి) 1 సి) 8 డి) 12
13. $7^{2n+1} \div 49 = 7^3$ అయిన $n =$. ()
 ఎ) 1 బి) 2 సి) 7 డి) 3
14. $x = a \left(\frac{m^2 + n^2}{2mn} \right)^{1/2}$ అయిన $\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + \sqrt{x^2 - a^2}}{\sqrt{x^2 + a^2} - \sqrt{x^2 - a^2}} =$ ()
 ఎ) mn బి) $m+n$ సి) $m-n$ డి) m/n
15. $\frac{\left(a + \frac{1}{b}\right)^x \left(a - \frac{1}{b}\right)^y}{\left(b + \frac{1}{a}\right)^x \left(b - \frac{1}{a}\right)^y} =$ ()
 ఎ) $(ab)^{xy}$ బి) $\left(\frac{a}{b}\right)^{xy}$ సి) $\left(\frac{a}{b}\right)^{x+y}$ డి) $\left(\frac{a}{b}\right)^{x-y}$
16. $(x^{m+n})^{m-n} \cdot (x^{n+p})^{n-p} \cdot (x^{p+m})^{p-m} =$ ()
 ఎ) 0 బి) 1 సి) $p+m$ డి) mnp
17. $\sqrt[n]{(512)^n} = 64$ అయిన $\frac{m}{n} =$ ()
 ఎ) $\frac{2}{3}$ బి) $\frac{3}{2}$ సి) $\frac{9}{2}$ డి) $3/4$
18. $\sqrt[m]{(x^n)^m} = 0.2$ అయిన $x^3 \dots$ ()
 ఎ) 0.04 బి) 0.08 సి) 0.008 డి) 0.0016

19. $\frac{36^{7/2} - 36^{9/2}}{36^{5/2}} = \dots$ ()
 ఎ) 1260 బి) 1296 సి) -1260 డి) -1296
20. $a^{1/3} + b^{1/3} + c^{1/3} = 0$ మరియు $(a + b + c)^3 = kabc$ అయిన $k =$ ()
 ఎ) 3 బి) 9 సి) 27 డి) 81
21. $a + b + c = 0$ అయిన $\frac{a^2}{x^{bc}} \cdot \frac{b^2}{x^{ac}} \cdot \frac{c^2}{x^{ab}} = \dots$ ()
 ఎ) 2 బి) x^3 సి) x^{abc} డి) $x^{a^2b^2c^2}$
22. $x = 2\sqrt{2} + 7$ అయిన $x + \frac{1}{x} = \dots$ ()
 ఎ) $4\sqrt{2}$ బి) $2\sqrt{3}$ సి) 7 డి) 1
23. $a = x + \sqrt{x^2 + 1}$ అయిన $x = \dots$ ()
 ఎ) $\frac{1}{2}\left(a - \frac{1}{a}\right)$ బి) $\frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)$ సి) 2 డి) $a - a^{-1}$
24. $x = 7 + 4\sqrt{3}$ మరియు $xy = 1$ అయిన $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \dots$ ()
 ఎ) 64 బి) 134 సి) 194 డి) $\frac{1}{49}$
25. $x - \frac{1}{x} = a$ అయిన $x^3 - \frac{1}{x^3} = \dots$ ()
 ఎ) a^3 బి) $3a$ సి) $a^3 - 3a$ డి) $a^3 + 3a$
26. $\frac{(a-b)^2}{(b-c)(c-a)} + \frac{(b-c)^2}{(a-b)(c-a)} + \frac{(a-c)^2}{(a-b)(b-c)} =$ ()
 ఎ) $3abc$ బి) $3(a-b)(b-c)(c-a)$ సి) 0 డి) 1
27. $a + b + c = 0$ అయిన $\frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2} =$ ()
 ఎ) abc బి) $\frac{1}{abc}$ సి) 0 డి) 1
28. $x + y + z = 0$ అయిన $\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz} =$ ()
 ఎ) -1 బి) 1 సి) 0 డి) $3xyz$

29. $x + y = 2z$ అయిన $\frac{x}{x-z} + \frac{z}{y-z} = \dots$ ()

ఎ) $1+x$ బి) yz సి) 1 డి) xyz

30. $x + \frac{1}{y} = 1$ మరియు $y + \frac{1}{z} = 1$ అయిన $z + \frac{1}{x} =$ ()

ఎ) xyz బి) 0 సి) $\frac{x}{y}$ డి) 1

31. $a = b = c$ అయిన $\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2} = \dots\dots$ ()

ఎ) 1 బి) 2 సి) 3 డి) 4

32. $\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] =$ ()

ఎ) $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc$ బి) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

సి) $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc(a+b+c)$ డి) $3abc$

33. $a + b + c = 9$ మరియు $a^2 + b^2 + c^2 = 29$ అయిన $a^2 + b^2 + c^2 - 3abc =$ ()

ఎ) 9 బి) 3 సి) 27 డి) 81

34. $x = a(b-c), y = b(c-a)$ మరియు $z = c(a-b)$ అయిన ()

$\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3 =$

ఎ) $\frac{3xyz}{abc}$ బి) $\frac{xyz}{abc}$ సి) 1 డి) $3xyzabc$

35. $a = 1$ వద్ద $15a^3 - (3a^2 - 1) - (4a^4 + a^3 - 3) + (a^3 - 1) =$ ()

ఎ) 11 బి) 1 సి) 10 డి) 17

36. $\frac{(83 \times 83 \times 83) + (27 \times 27 \times 27)}{(83 \times 83) - (83 \times 27) + 27 \times 27} =$ ()

ఎ) 166 బి) 110 సి) 56 డి) 54

ప్రాక్టీస్ బిట్స్ - 3

1. $x^2 + 1 = 2x$ అయిన $x^7 + x^5 + x^4 + x^{-9} + x^{-8} =$ ()
 ఎ) 0 బి) 4 సి) 5 డి) 8
2. $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + \dots + 2^{x+7} = 255$ అయిన $x =$ ()
 ఎ) 0 బి) 2 సి) -1 డి) 1
3. $\frac{154}{69} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d}}}$ అయిన $(c + d) - (a + b) =$ ()
 ఎ) 4 బి) 5 సి) 6 డి) 2
4. $x + y + z = 0$ అయిన $\frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy} =$ ()
 ఎ) $\sqrt{3}$ బి) $3\sqrt{3}$ సి) 3 డి) 0
5. $2^n - 2^{n-1} = 4$ అయిన $n^n =$ ()
 ఎ) 1 బి) $3/2$ సి) 2 డి) 27
6. $\frac{(3.63)^2 - (2.37)^2}{3.63 - 2.37} =$ ()
 ఎ) 6 బి) 1.36 సి) 2.26 డి) 1.26
7. $(x^6 \cdot y^{-5/4})^{-4/3} =$ ()
 ఎ) $x^{-24}y$ బి) $x^{-8}y^{5/3}$ సి) $x^8 \cdot y^{-5/3}$ డి) $x^{-8} \cdot y^{-5/3}$
8. $\left(\frac{7}{5}\right)^{-8} \times \left(\frac{7}{5}\right)^{-12} = \left(\frac{7}{5}\right)^{5x}$ అయిన $x =$ ()
 ఎ) 5 బి) -5 సి) 4 డి) -4
9. a, b, c లు మూడు ధన వాస్తవ సంఖ్యలు $a(b + c) = 44, b(c + a) = 50, c(a + b) = 54$ అయిన $abc =$ ()
 ఎ) 210 బి) 120 సి) 126 డి) 156
10. $x = 5$ అయిన $(x + 2)(2x - 1) + (2x + 1)(3x - 4)$ ()
 ఎ) 0 బి) 124 సి) 168 డి) 184

11. a, b, c లు మూడు వాస్తవ సంఖ్యలు $a - 7b + 8c = 4$ మరియు $8a + 4b - c = 7$ ()
అయిన $a^2 - b^2 + c^2 = \dots$
ఎ) 4 బి) 1 సి) 5 డి) 11
12. a, b, c లు మూడు వాస్తవ సంఖ్యలు $a + b + c = 7, a^2 + b^2 + c^2 = 35$ ()
 $a^3 + b^3 + c^3 = 151$ అయిన $abc =$ విలువ
ఎ) -15 బి) 1 సి) 5 డి) 11
13. $(a-1)^2 + (b-2)^2 + (c-3)^2 + (d-4)^2 = 0$ అయిన $abcd + 1 = \dots$ ()
ఎ) 0 బి) 1 సి) 25 డి) 24
14. $a^2 - b^2 = 21$ మరియు $a^2 + b^2 = 29$ అయిన $ab = \dots$ ()
ఎ) 10 బి) 0 సి) 25 డి) 16
15. a, b, c లు మూడు ప్రధాన సంఖ్యలు $abc = 17(a + b + c)$ అయిన ()
 a, b, c లు వరుసగా
ఎ) 19, 07, 2 బి) 17, 09, 2 సి) 13, 19, 17 డి) 2, 17, 19
16. $a^3 + 3a^2 + 3a + 2 = 0$ అయిన $(a+1)^{2018} + (a+1)^{2019} + (a+1)^{2020} =$ ()
ఎ) 0 బి) 1 సి) 2 డి) -1
17. a, b, c లు మూడు వాస్తవ సంఖ్యలు $a^2 + 4b^2 + 16c^2 = 48$ మరియు ()
 $ab + 4bc + 2ca = 24$ అయిన $a + 2b + 4c =$
ఎ) 144 బి) 12 సి) 121 డి) 11
18. $\frac{(2^4)^6}{(4^6)^2} = \dots$ ()
ఎ) 20 బి) 32 సి) 1 డి) 8
19. మూడు సంఖ్యల మొత్తం 150, రెండవ సంఖ్య మొదటి సంఖ్యకు 3 రెట్లు ()
మరియు మూడవ సంఖ్య రెండవ సంఖ్య రెట్టింపుకు 10 తక్కువ అయిన
రెండవ సంఖ్య ఎంత ?
ఎ) 16 బి) 36 సి) 86 డి) 48
20. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 7. ఒక సంఖ్య నుండి మరొక సంఖ్యను తీసివేసిన ()
ఫలితం 5 అయిన ఆ సంఖ్యలు
ఎ) 6, 3 బి) 6, 1 సి) 2, 7 డి) 8, 1

21. $x^2 + xy = 20$ మరియు $y^2 + xy = 30$ అయిన $xy =$ ()
 ఎ) 8 బి) 10 సి) 12 డి) 14
22. $3x - y = 12$ అయిన $\frac{8^x}{2^y} =$ ()
 ఎ) 2^{12} బి) 12^2 సి) 3^{12} డి) 16
23. $\sqrt{x-3} = y$ మరియు $\sqrt{y-4} = z$ మరియు $\sqrt{z-5} = 2$ అయిన $x =$ ()
 ఎ) 6129 బి) 6565 సి) 7103 డి) 7228
24. $\frac{x}{y+z} = \frac{y}{z+x} = \frac{z}{x+y}$ అయిన ప్రతి భిన్నము ... కి సమానం ()
 ఎ) $\frac{1}{2}$ బి) -1 సి) $\frac{1}{2}$ లేదా -1 డి) $\frac{1}{2}$ లేదా 1
25. $a+b=123, b+c=37, c+a=40$ అయిన $\sqrt{a+b+c} =$ ()
 ఎ) 30 బి) 20 సి) 10 డి) 18
26. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$ అయిన $x = \dots$ ()
 ఎ) 2 బి) 3 సి) 4 డి) 1
27. $\frac{2^{n+2} - 2^{n+1}}{4 \times 2^{n-1}} =$ ()
 ఎ) 1 బి) 2 సి) 3 డి) 4
28. $x^{ab} + 1$ కి $x^a + 1$ ఒక కారణాంకం అయిన 'b' అనేది... సంఖ్య ()
 ఎ) జేసి సంఖ్య బి) సరి సంఖ్య సి) ఋణ సంఖ్య డి) కరణీయ సంఖ్య
29. $(-2.56 \times 4.2)^0 = \dots$ ()
 ఎ) 0 బి) 1 సి) 10.752 డి) -10.752
30. 'a'కి మూడవ వంతుకు m కలిపి రెట్టింపు చేయగా వచ్చు బీజీయ సమాసం ()
 ఎ) $\frac{1}{3}(2a+m)$ బి) $2 + \left(\frac{1}{3}a+m\right)$ సి) $\frac{2}{3}a+m$ డి) $2\left(\frac{1}{3}a+m\right)$
31. ఒక సంఖ్య యొక్క మూడవ వంతు, దాని నాలుగవ వంతు, దాని ఏడవ వంతు ()
 20 అయిన ఆ సంఖ్య ...
 ఎ) 420 బి) 240 సి) 1680 డి) 560

32. $\left(\frac{a^{11}}{a^{13}}\right)^{\frac{1}{143}} \times \left(\frac{a^{13}}{a^7}\right)^{\frac{1}{91}} \times \left(\frac{a^7}{a^{11}}\right)^{\frac{1}{77}} = \dots\dots\dots$ ()
- ఎ) a బి) $\frac{1}{a}$ సి) 1 డి) -1
33. $2^{5/2} - 2^{3/2}$ విలువ ()
- ఎ) $2\sqrt{2}$ బి) $3\sqrt{2}$ సి) $5\sqrt{2}$ డి) $\sqrt[3]{2}$
34. $12 \div [2(6-7+4)] \times 2 =$ ()
- ఎ) 2 బి) 4 సి) 6 డి) 8
35. $12 \div 2(6-7+4) \times 2 =$ ()
- ఎ) 2 బి) 4 సి) 36 డి) 18
36. $2(3+2x) - 5(x-1) = 12$ అయిన $x =$ ()
- ఎ) -3 బి) -2 సి) -1 డి) 1
37. $5^x = 1000$ అయిన $5^{x-2} =$ ()
- ఎ) 10 బి) 20 సి) 80 డి) 40
38. $1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23+25 =$ ()
- ఎ) 13^2 బి) 14^2 సి) 11^2 డి) 12^2
39. $3x - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x - 4x = \dots\dots\dots$ ()
- ఎ) 2 బి) 1 సి) 0 డి) -1
40. $a=0, b=1$ అయిన $(a-b)(a+b)(a^2+b^2)(a^4+b^4) = \dots\dots\dots$ ()
- ఎ) -1 బి) 0 సి) 1 డి) 2

LEVEL - 1, ANSWERS

1. B	16. B	31. B	46. C	61. A	76. A
2. D	17. D	32. A	47. B	62. C	77. B
3. A	18. A	33. B	48. B	63. A	78. A
4. C	19. D	34. B	49. C	64. C	79. D
5. D	20. B	35. C	50. A	65. A	80. D
6. A	21. C	36. B	51. C	66. C	
7. D	22. C	37. D	52. B	67. C	
8. B	23. B	38. D	53. D	68. A	
9. C	24. D	39. C	54. C	69. A	
10. B	25. B	40. C	55. A	70. A	
11. B	26. D	41. A	56. B	71. D	
12. D	27. C	42. C	57. C	72. A	
13. B	28. C	43. D	58. A	73. C	
14. A	29. A	44. A	59. A	74. C	
15. C	30. D	45. A	60. B	75. B	

LEVEL - 2, ANSWERS

1. A	10. A	19. C	28. A
2. A	11. D	20. C	29. C
3. C	12. C	21. B	30. D
4. B	13. B	22. A	31. C
5. C	14. D	23. A	32. B
6. B	15. C	24. C	33. C
7. B	16. B	25. D	34. A
8. D	17. B	26. C	35. A
9. A	18. C	27. C	36. B

LEVEL - 3, ANSWERS

1. C	11. B	21. C	31. C
2. A	12. A	22. A	32. C
3. D	13. C	23. D	33. A
4. C	14. A	24. C	34. B
5. D	15. D	25. C	35. C
6. A	16. B	26. C	36. C
7. B	17. B	27. A	37. D
8. D	18. C	28. A	38. A
9. B	19. D	29. B	39. C
10. D	20. B	30. D	40. A